



SiloLact

PARSILACT

پارسی لاكت



Silage Starter افزودنی سیلو

غنى سازی و افزایش کیفیت سیلوی
ذرت، یونجه، شبدر، سورگوم، قصیل جو

قوطی ۴۰۰ گرمی پودر محلول در آب



www.ParsiLact.com



پیشنهادات مدیریتی جهت افزایش کیفیت سیلولوچی جو:

گیاه جو بدلیل نیاز آبی کمتر، مقاومت بیشتر نسبت به خشکی و شوری خاک در شرایط فعلی گزینه مناسبی جهت سیلولوچی می‌باشد.

۱. علوفه جو ظرفیت بافری بیشتر و خاصیت سیلولوژیری خوبی دارد و بسته به واریته‌های کشت شده در هر هکتار حدود ۴۰ تا ۵۰ تن علوفه تولید می‌شود.

۲. پروتئین بیشتری نسبت به ذرت دارد.

۳. دانه‌ها باید خمیری و کاملاً پرشده باشند و حالت شیری نداشته باشند. ماده خشک گیاه جو باید حدود ۳۰ درصد باشد و ماده خشک بیشتر به دلیل عدم فشردگی و نبود قندهای محلول منجر به کاهش کیفیت سیلولوچی گردد.

۴. گیاه جو باید سیز رنگ و قسمت‌های پایینی آن شروع به زرد شدن کرده باشد.

۵. اندازه قطعات باید ریز باشد و اندازه ۱۰ سانتی متر بسیار مناسب است.

۶. در زمان برداشت باید از مقطع مناسب برداشت شود تا به هیچ وجه خاک به سیلولوچی نشود.

۷. فیبر جو خاصیت ارجاعی بیشتری در زمان سیلولوچی کردن دارد و بدلیل اینکه ماده خشک بیشتر و رطوبت کمتر در مقایسه با ذرت دارد (تراکم پذیری کمتر جو در مقایسه با ذرت)، پس در مقایسه با ذرت، نیاز به کوبیدن بیشتری دارد.

مواد تشکیل دهنده:

- لاکتوباسیلوس پلاتراروم
- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
- دکستروزمونوهیدرات
- حاوی آنزیم‌های سلولاز و زایلاناز

مزایای استفاده از سیلولوچی:

- کاهش سریع PH
- پیشگیری از رشد قارچ‌ها و مخمرها
- قابلیت هضم فیبر
- جلوگیری از کاهش ماده خشک
- افزایش ارزش غذایی
- کاهش اتلاف انرژی
- جلوگیری از کاهش پروتئین در زمان اسیدی شدن

میزان و روش مصرف:

هر قوطی سیلولوچی حاوی ۴۰۰ گرم پودر محلول در آب است که به عنوان افزودنی سیلولوچی برای ۵۰ تن سیلولوچی مصرف قرار می‌گیرد. ابتدا یک لیتر آب تمیز بدون کلر را به محتویات هر بطری اضافه نموده و به خوبی تکان دهید و سپس حجم آب را به ۲۰ لیتر رسانده و هر لیتر از محلول را بر روی ۲/۵ تن علوفه اسپری گردد.

شرایط نگهداری:

● بطری باز نشده محصول را می‌توان در جای خنک (یخچال) نگهداری نمود.

● جهت مصرف محصول از آب تمیز و بدون کلر استفاده گردد.

● در صورت باز نمودن درب بسته پس از استفاده باید درب کاملاً بسته شده و ظرف محصول در یخچال نگهداری شود.

توجه: پس از اضافه نمودن آب، محصول باید در کمترین زمان ممکن مصرف شود.

بسته‌بندی:

● قوطی ۴۰۰ گرمی پودر محلول در آب

بهترین زمان مصرف:

● ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید

پیشنهادات مدیریتی جهت افزایش کیفیت سیلولوچی ذرت:

۱. بهترین زمان برداشت ذرت علوفه ای جهت سیلولوچی زمانی است که دانه‌های ذرت حالت خمیری داشته و کاکلهای کلاله ذرت رو به خشکی رفته باشد، همچنین برگ‌های بالایی ساقه ذرت هنوز سبز بوده و تعداد یک الی دو عدد از برگ‌های پایینی رو به زردی و خشکی رفته باشد.

۲. ذرت علوفه‌ای از واریته‌های مطلوب بوده و به اندازه کافی آبیاری شده باشد و دچار سرمزدگی و کپک‌زدگی نشده باشد.

۳. هنگام برداشت باید ارتفاع دستگاه چاپر با زمین (ارتفاع برش) به اندازه‌ای باشد تا ذرت چاپر شده با خاک آگوده نشود. خاک علاوه بر ایجاد مشکلات گوارشی در دام باعث رشد اسپری قارچ‌های موجود در خاک و خرابی سیلولوچی نشود.

۴. اندازه قطعات ذرت برداشت شده باید بین ۱۰-۱۵ سانتی متر باشد.

۵. سیلولوچی ذرت باید در حداقل زمان ممکن پر، فشرده و پوشیده شود.

۶. حداقل مدت زمان تخمیر و آماده مصرف شدن سیلولوچی ۳-۴ هفته می‌باشد.

۷. میزان ماده خشک علوفه ذرت اگر ۵۰ درصد باشد در حد مطلوب است.

Manufactured by Pardis Roshd Mehregan Co.

308 Ave., North Pazhohesh, Shiraz Industrial Estate, Fars, Iran

+98 71-37744778

Info@Bioexir.com

+98 71-37743558-9

info@ParsiLact.com

شرکت فراورده‌های زیستی پردیس رشد مهرگان

فارس، شهرستان شهرک بزرگ صنعتی، پژوهش شمالی، خیابان ۳۰۸

تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۴۴۷۷۸-۹۰۰۰

نماش: ۰۷۱-۳۷۷۴۴۷۷۸-۹۰۰۰



ParsiLact
پارسی لاكت

ساخت ایران
Made in Iran

PARSILACT

پارسی لاكت