

مکمل پروبیوتیک آبی پروری پوند کلینر

میزان و روش مصرف

در خوراک ماهی و میگو: میزان ۱۰۰۰ گرم در ۱۰ کیلو
شکر + ۱۰۰ لیتر آب بعد از ۴ الی ۵ ساعت جهت ۶۰۰۰
متر مکعب

بهترین زمان مصرف: ۲۴ ماه پس از تولید

در شرایط استرس، رشد ضعیف و شرایط بیماری میزان مصرف را
می توان تا دو برابر افزایش داد



1kg

باسیل ها	سویه های باکتری های پروبیوتیک
لاکتوباسیل ها	
باکتری های تکمیل کننده چرخه نیتروژن	
باکتری های فتوسنتز کننده	متابولیت های تخمیری
	آنزیم ها
	حجیم کننده های مجاز
شمارش کلی باکتری ها: $(1 \times 10^{12} \text{ CFU/g})$	

اثرات پارسی لاکت

- تجزیه مواد آلی و بقایای حیوانی، ترکیبات چربی و لجن کف استخر
- کاهش مشکلات آب و خاک
- کاهش آمونیاک، سولفید، هیدروژن، نیترات، COD و BOD
- تقویت شکل گیری باکتری ها و فیتوپلانکتون های تشکیل دهنده فلاک
- کمک به کنترل جلبک آبی - سبز
- بهبود شرایط زنده مانی، فعال کردن سیستم ایمنی

